

A.S.L. (N8/S9) NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY

Nawóz „A.S.L.” powstaje podczas fermentacji beztlenowej substancji organicznych, odbywającej się w instalacjach biometanu, koncernu macierzystego VERBIO AG. W całkowitej zawartości azotu dominuje forma amonowa, czyli będąca łatwo przyswajalną przez rośliny. Roztwór siarczanu amonu „A.S.L.” N8 / S9 poza zawartością siarki oraz azotu stanowi bogate źródło podstawowych składników pokarmowych roślin. „A.S.L.” znajduje zastosowanie pod wszystkie rośliny uprawy polowej na gruntach ornych (zboże, rzepak, rośliny pastewne i przemysłowe), a w szczególności w przypadku upraw roślin o dużym zapotrzebowaniu na siarkę (tj. rzepaku, ziemniaka, kukurydzy).



Korzyści z zastosowania nawozu „A.S.L.”:

- wysoka przyswajalność
- możliwość mieszania nawozu „A.S.L.” z innymi nawozami
- całoroczna dostępność nawozu
- stosowanie przedsiewne i pogłównie
- nawóz idealny pod wszystkie rośliny uprawy polowej
- optymalna relacja pomiędzy kosztami, a korzyściami ze stosowania
- stabilna jakość

Sposoby i terminy stosowania nawozu

Nawóz „A.S.L.” przeznaczony jest do stosowania przedsiewnego i pogłównego pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Zaleca się użycie nawozu, jako dawki startowej z początkiem wiosny, a także po zbiorach, jako nawóz przedwiosenny do kolejnego plonu głównego. Nawóz należy stosować przed rozpoczęciem siewu roślin, doglebowo przy pomocy specjalnych aplikatorów np. węży wleczonych albo powierzchniowo przy pomocy rozlewaczy nawozów / opryskiwaczy z natychmiastowym przykryciem glebą. Stosowanie nawozu dopuszcza się w okresie od 1 marca do 30 listopada. Ponadto „A.S.L.” nadaje się do mieszania z innymi nawozami płynnymi.

Warto również zaznaczyć, iż roztwór siarczanu amonu dzięki swojej stabilnej jakości gwarantuje dobrą i niezmienną przyswajalność zarówno azotu, jak i siarki przez rośliny, a co za tym idzie wysokie plony.

Przechowywanie nawozu „A.S.L.”

Nawóz należy przechowywać w temperaturze otoczenia w szczelnych, przystosowanych do tego celu zbiornikach z tworzywa sztucznego lub ze stali szlachetnej, nie będące podatnymi na korozję. Nawóz krystalizuje w temperaturze około -10 °C.



**NAWÓZ POSIADA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI DO STOSOWANIA
W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH.**

Decydując się na nawóz „A.S.L.” osiągną Państwo wysokie plony niezależnie od pogody!

Zapotrzebowanie poszczególnych roślin na azot i siarkę

Zapotrzebowanie na azot i siarkę			
Gatunek	Plon t/ha	Azot (kg/ha)	Siarka (kg/ha)
Pszenica ozima	6-10	180-220	30-50
Jęczmień ozimy	7-9	120-160	30-40
Jęczmień jary	6-9	70-120	25-40
Żyto	6-8	120-200	20-32
Pszenżyto	6-8	180-200	20-30
Kukurydza	8-12	160-240	40-60
Rzepak	4-5	180-220	60-100
Burak cukrowy	60-100	120-240	50-80
Ziemniak	30-50	120-200	18-30
Cebula	30-50	160-220	80-100

Skład nawozu „A.S.L”

Okolo 8 % N-całkowitego azotu
jako azot amonowy

Okolo 9 % S- siarki w postaci
siarki siarczanowej

Dane techniczne

- Wartość pH 4-4,5
- Gęstość (przy temp. 20 stopni C)
ok. 1,23 g/m³
- Małe zagrożenie dla wody (klasa
zagrożenia 1)
- „A.S.L” nie jest preparatem
niebezpiecznym
W myśl Dyrektywy 67/548/EWG.

Terminy stosowania ASL

Terminy stosowania i dawki ASL (l/ha)	
Ziemniaki	
1 - przed wschodami	800
Zboża ozime	
1 - przed wschodami	400
2 - krzewienie	300
Zboża jare	
1 - przed wschodami	400
2 - krzewienie	300
Buraki	
1 - przed siewem lub wschodami	500
Rzepak	
1 - po wschodach	300-500
2 - wiosenne ruszenie wegetacji	500
Kukurydza	
1 - przed wschodami	500 -700



AGROIMPEX TRADE SP. Z O.O.

Słonów 89A
66-520 Dobiegniew

Tel. 795958522
Tel. 606560559

biuro@agroimpex-trade.pl